

العلاج الكيماوي

العلاج الكيماوي هو أحد العلاجات الرئيسية المستخدمة لعلاج سرطان البنكرياس. وهو ينطوي على استخدام الأدوية لقتل الخلايا السرطانية في جسمك. يمكن أن يؤدي العلاج الكيماوي أيضًا إلى إتلاف الخلايا السليمة التي غالبًا ما تسبب الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي.

اعتمادًا على خطة العلاج الخاصة بك، قد تتلقى العلاج الكيماوي لوحده، أو مع العلاج الإشعاعي و / أو الجراحة. ستعتمد خطة العلاج الخاصة بك على مرحلة السرطان.

- يمكن وصف العلاج الكيماوي بأهداف علاجية مختلفة. قد يوصي طبيبك بالعلاج الكيماوي من أجل:
- تقليل الورم قبل الجراحة للحصول على فرصة أفضل للاستئصال (يسمى العلاج الكيماوي المساعد الجديد)
 - تدمير أي خلايا سرطانية متبقية بعد الجراحة للمساعدة في منع السرطان من العودة (يسمى العلاج الكيماوي المساعد)
 - عندما لا تكون الجراحة خيارًا، يمكن أن تبطئ نمو السرطان.
 - يتم إعطاء العلاج الكيماوي بشكل عام من خلال التنقيط (عن طريق الوريد) في الأوردة. بعض أدوية العلاج الكيماوي تأتي أيضًا في شكل أقراص.

قبل العلاج الكيماوي، سيزودك فريق الأورام الطبي بمعلومات مفصلة عن أدوية العلاج الكيماوي والآثار الجانبية الشائعة بناءً على خطة العلاج الفردية الخاصة بك. سيشرح ذلك معلومات حول التحضير للعلاج الكيماوي، وما يمكن توقعه بعد ذلك وكيفية إدارة الآثار الجانبية بشكل أفضل.

الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي

تعمل معظم أدوية العلاج الكيماوي على قتل الخلايا سريعة النمو (مثل الخلايا السرطانية). قد تؤثر أيضًا على أنواع أخرى من الخلايا سريعة النمو مثل الخلايا الموجودة في نخاع العظام والجهاز الهضمي والجلد والشعر والأظافر. هذا يؤدي إلى آثار جانبية شائعة للعلاج الكيماوي، بما في ذلك:

- الغثيان والقيء
- تساقط الشعر
- تغيرات الجلد والأظافر
- تقرحات الفم
- تغيرات في الشهية والتذوق والشم
- زيادة خطر الإصابة بالعدوى (بسبب انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء)

- ظهور كدمات أو نزيف بسهولة أكبر (نتيجة انخفاض عدد الصفائح الدموية)
- فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء) مما يؤدي إلى التعب وضيق التنفس.

يمكن أن تؤدي بعض أدوية العلاج الكيماوي إلى تأثيرات محددة طويلة المدى على القلب والكلى والأعضاء الأخرى، بالإضافة إلى مشكلات الخصوبة. تختلف شدة ونوع الآثار الجانبية بشكل كبير بين الأفراد وتعتمد على الأدوية المحددة المستخدمة والجرعة ومدة العلاج.

قد تسبب علاجات سرطان البنكرياس أيضًا تغييرات في كيفية عمل البنكرياس. نتيجة لهذه التغييرات، قد تواجه الأعراض التالية:

- الغثيان والقيء
- الإسهال
- فقدان الشهية
- التغييرات في عادات الأمعاء
- حرقة المعدة أو عسر الهضم
- الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام (الشبع المبكر).

قبل بدء العلاج الكيماوي، سيناقدش طبيبك خيارات العلاج معك والآثار الجانبية المحتملة لعلاجك المحدد. إذا بدأت تعاني من أي آثار جانبية، أبلغ فريق الرعاية الصحية الخاص بك على الفور حتى يمكن إدارتها بفعالية وفي أسرع وقت ممكن.

يرجى التواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات على 03 9426 8880 أو البريد الإلكتروني

EHJreissatiFamilyPan@epworth.org.au